

Fiche Repère

Double campagne vaccinale Covid et grippe

	Covid		Grippe saisonnière
	6 mois - 4 ans	≥ 5 ans	
Période	A partir du 2 octobre 2023		A partir du 17 octobre 2023
Recommandations	<ul style="list-style-type: none"> • Professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ou en contact régulier avec des personnes à risque de forme grave • Résidents des Ehpad, patients d'USLD • ≥ 65 ans • Femmes enceintes, quel que soit le trimestre • ≥ 6 mois ET à risque de forme grave (dont affection chronique, diabète, cancer, immunodéprimé, IMC ≥ 40) • Entourage des personnes immunodéprimées et des nourrissons < 6 mois présentant des risques de forme grave • Professionnels du voyage (navigants, accompagnateurs) 		
	Personnes atteintes de troubles psychiatriques, démence, trisomie 21		Professionnels exposés aux virus influenza porcins/aviaires
Avec quel vaccin	<ul style="list-style-type: none"> • Comirnaty® Omicron XBB.1.5 à 3 µg marron 	<ul style="list-style-type: none"> • Préférentiellement vaccin à ARNm adapté monovalent Comirnaty® Omicron XBB.1.5 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 5-11 ans : à 10 µg bleu foncé ◦ ≥ 12 ans : à 30 µg gris foncé • Alternative sous condition ≥ 12 ans, hors grossesse vaccin à protéine recombinante monovalent Nuvaxovid® XBB.1.5 	<ul style="list-style-type: none"> Vaccin tétravalent • Remboursé à partir de 6 mois : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Fluarix Tetra® ◦ Influvac Tetra® ◦ Vaxigrip Tetra® • Remboursé à partir de 65 ans : <ul style="list-style-type: none"> ◦ Efluelda®
Schéma vaccinal	<ul style="list-style-type: none"> • Primovaccination <ul style="list-style-type: none"> ◦ Sans infection durant le schéma vaccinal : <ul style="list-style-type: none"> - 3 doses - intervalles D1-D2 = 3 sem, D2-D3 = 8 sem ◦ Infection durant le schéma vaccinal : <ul style="list-style-type: none"> - après D1 : intervalle infection-D2 = 3 mois, pas de D3 - après D2 : intervalle infection-D3 = 3 mois • Rappel (déjà primovacciné ou infecté) <ul style="list-style-type: none"> - 1 dose unique - en respectant un délai de 6 mois - après la dernière infection ou injection 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 dose unique (quel que soit le passé vaccinal, y compris en l'absence de vaccination préalable) • en respectant un délai après la dernière infection ou injection de : <ul style="list-style-type: none"> ◦ 6 mois pour la population cible ◦ 3 mois pour les immunodéprimés, ≥ 80 ans, résidents des Ehpad et USLD 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 mois à 9 ans : <ul style="list-style-type: none"> ◦ primo-vaccination : 2 doses (0,5ml) D1/D2 à 1 mois ◦ rappel : 1 dose (0,5ml) annuelle • 9-59 ans : <ul style="list-style-type: none"> ◦ 1 dose annuelle de 0,5ml ◦ Fluarix Tetra®, Influvac Tetra®, Vaxigrip Tetra® • ≥ 60 ans : 1 dose annuelle <ul style="list-style-type: none"> ◦ 0,5ml si Fluarix Tetra®, Influvac Tetra®, Vaxigrip Tetra® ◦ 0,7 ml si Efluelda®

Possibilité de réaliser la vaccination contre la grippe et la Covid **en même temps** (un dans chaque bras, à partir du 17 octobre)

OU **en décalé** (pas d'intervalle minimum à respecter entre les 2 injections).